

STELLINGEN

1.

De inlay-techniek volgens Esser heeft op betrekkelijk eenvoudige wijze, in combinatie met tandheelkundige prothetische voorzieningen, uitgebreide gelaatsreconstructies mogelijk gemaakt.

2.

De door Esser zo fel gepropageerde systematische toepassing van de arteriële lap, is waarschijnlijk meer dan 40 jaar belemmerd in zijn verdere ontwikkeling, uit vrees de vaatsteel te beschadigen en door het dogmatisch vasthouden aan de principes van de buislap van Gillies.

3.

Esser's relatieve onbekendheid in eigen land werd veroorzaakt door zijn frequent wisselende buitenlandse werkkring, zijn persoonlijkheidsstructuur en de neutrale houding van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

4.

Naar analogie van de overigens verwarrende terminologie van bepaalde huidlappen naar nationaliteit, zoals de Franse en Italiaanse lappen, zouden de lappen volgens de principes van Esser, het beste 'Nederlandse lappen' kunnen worden genoemd.

5.

De introductie van de lokale anaesthesie in de kliniek in het begin van deze eeuw heeft evenveel voor de plastische chirurgie betekend, als de klinische toepassing van de narcose voor de algemene chirurgie.

6.

Het verdient aanbeveling om routinegewijs bij negroïde patiënten een sikkeltest te verrichten.

7.

Het is onjuist er zonder meer op te vertrouwen dat een, als gevolg van uitgebreide brandwonden, totaal verlittekende buikwand onder invloed van hormonen tijdens de zwangerschap voldoende zal meerekken.

8.

Bij een acuut trauma met blootliggend bot, is een primaire bedekking van het bot door middel van goed gevasculariseerd weefsel, zoals een myocutane of fasciocutane lap geïndiceerd. De plastisch chirurg dient derhalve op een vroeg tijdstip in de multidisciplinaire behandeling van een ernstig trauma met uitgebreid weke-delenverlies te worden ingeschakeld.

9.

Het is niet aangetoond dat een additionele lumbale sympathectomie de klinische resultaten van een aorta-iliacale vaatreconstructie verbetert.

10.

Voor de behandeling van urinestenen in het pyelo-caliceale systeem verdient de percutane nefrolithotomie de voorkeur boven de conventionele steenchirurgie.

11.

Het is onfysiologisch een hallux rigidus te behandelen door middel van een arthrodese van het eerste metatarsophalangeale gewricht. Reconstructie van dit gewricht door middel van een arthroplastiek verdient de voorkeur.

12.

Het verdient aanbeveling dat de aanstaande tropenarts naast de verplichte stages chirurgie en gynaecologie, ook praktisch kennis neemt van de pathologische anatomie en de kindergeneeskunde.

13.

De op de muren van de Haagse conglomeratie in het oog vallende graffiti-stroming heeft niets te maken met een kunstuiting, maar moet worden gezien als een oneigenlijk gebruik van het schrijven.

Stellingen behorende, bij het proefschrift:

Dr. J.F.S. Esser and his influence on the development of
plastic and reconstructive surgery.

B. Haeseker. November 1983.